

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



90815

充血・疲れ目に

バイシン®
Visine®

〈目薬〉

第2類医薬品

バイシンは、充血クリア成分「塩酸テトラヒドロソリン」配合で、充血や目の疲れに効きます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみ改善されない場合。
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません。

【効能・効果】

結膜充血、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回1～2滴を1日3～4回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズ及びO₂コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】


パイシン10mL中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	5mg	末梢血管収縮作用により結膜の充血を取り除きます。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物液、エドト酸Na、pH調整剤、等張化剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



【包装】

パイシン：10mL

キャップシールの開け方



矢印のところからキャップシールをはがし(①)、ミシン目にそって矢印の方向にキャップシールを取り去ってください(②)。シールの切れ端が残った場合には、それを切り取ってからご使用ください。製品本体部のシールを破らないようご注意ください。

お願い：パイシンは安全キャップシールを採用しています。万一、シールがはがれている場合は、ご使用にならないようお願い申し上げます。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪府中央区道修町四丁目1番1号

© J&J KK 2015
® 登録商標
1HE
90815