

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



90817

目の疲れ・充血に

バイシンプラスⅡ

Visine® PlusⅡ

トリプルビタミン配合

〈目薬〉

第2類医薬品

バイシンプラスⅡは、「ビタミンB₆」「パンテノール(プロビタミンB₅)」「天然型ビタミンE」のトリプルビタミンと「タウリン」を配合。有効成分が瞳の組織代謝機能を促進し、目の疲れに優れた効果を発揮します。

また充血クリア成分「塩酸テトラヒドロソリン」配合で、疲れ目等により起こってしまった充血にも効果的です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみ改善されない場合。
(2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回1~3滴を1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズ及びO₂コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】


バイシンプラスⅡ 10mL中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	5mg	目の細胞に栄養を与え、新陳代謝を促進します。
パンテノール(プロビタミンB ₅)	5mg	
タウリン	100mg	
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	5mg	抗酸化作用、膜安定化作用、血行促進作用によって細胞の老化を防ぎます。
塩酸テトラヒドロソリン	5mg	末梢血管収縮作用により、疲れによる目の充血を取り除きます。
グリチルリチン酸二カルシウム	25mg	目の炎症を抑え、傷ついた目の組織を改善します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.5mg	目のピント調整をつかさどる神経に直接作用して、調節機能を改善します。

添加物として、リン酸水素Na、アミノカプロン酸、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、エデト酸Na、ホウ酸、プロピレングリコール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ℓ-メントール、d-ボルネオール、グラニオール、pH調整剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封後は、外箱に入れるなどして暗所に保管してください。



【包装】

バイシンプラスⅡ：10mL

キャップシールの開け方



矢印のところからキャップシールをはがし①、ミシン目にそって矢印の方向にキャップシールを取り去ってください②。シールの切れ端が残った場合には、それを切り取ってからご使用ください。
製品本体部のシールを破らないようご注意ください。

お願い：バイシンプラスⅡは安全キャップシールを採用しています。
万一、シールがはがれている場合は、ご使用にならないようお願い申し上げます。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

© J&J KK 2015

® 登録商標

1EC

90817