



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ザッツ21

胃腸薬

第2類医薬品

特徴

現代の食生活や生活環境を考えてつくられた胃腸薬で、食べすぎ、飲みすぎ、胃部膨満感などにすぐれた効果をあらわします。2種の消化酵素が、胃もたれの原因となりやすい脂肪をはじめ、でんぷん、たん白質の消化を促進します。胃酸の強さに応じて制酸剤の効果が調節されるので、胃の酸の多い少ないを気にせず服用できます。荒れた胃の粘膜を保護・修復します。芳香のある灰かっ色の服用しやすい錠剤です。

- 消化促進
- 制酸・鎮痛
- 粘膜修復

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
(8) 副交感神経遮断剤(ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロバミド、ロートエキス等)含有する内服薬を服用している人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

(2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
口の渇き、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

効 能

食べすぎ、飲みすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振、胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸過多、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胃部不快感

(裏面へ続く)

