

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ザッツ®

胃腸薬

第2類医薬品

特徴

胃が張った感じがする、胃がもたれるといった症状に適した胃腸薬です。

胃腸機能を調整するカルニチン塩化物をはじめ、5種の健胃生薬が、弱った胃のはたらきを高め、胃部膨満感、胃もたれ等にすぐれた効果をしめします。3種の制酸成分の組み合わせにより、おだやかな制酸作用をしめし、胃重、胃部不快感、胸やけ等を緩和します。

生薬のカンゾウが飲みすぎ、食べすぎ等により荒れた胃の粘膜の修復を助けます。スツとした清涼感のある服用しやすい灰かっ色微粒状の細粒です。

携帯に便利な分包(アルミ包装)です。

●胃部膨満感 ●胃もたれ
●胃部不快感

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
口の渇き、便秘、下痢

効 能

胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胃重、胃部不快感、食欲不振、胃弱
飲みすぎ、食べすぎ、消化不良、胸つかえ
胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸過多、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、
嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の量を、食前または食後に、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	3 回
11歳～14歳	2/3包	
8歳～10歳	1/2包	
5歳～7歳	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。


成 分 3包(4.2g、15歳以上の1日服用量)中

はたらき	成 分	含 量
胃腸機能の調整	カルニチン塩化物	450mg
	陳皮乾燥エキス	150mg(陳皮1,200mgより抽出)
	コウボク乾燥エキス	20mg(厚朴240mgより抽出)
健胃生薬	ソウジュツ末	200mg
	ショウキョウ末	100mg
	チョウジ末	30mg
	カンゾウ末	150mg
胃粘膜の修復	合成ヒドロタルサイト	700mg
制 酸	水酸化マグネシウム	450mg
	ジヒドロキシアリミニウムアミノアセテート	300mg

添加物：合成ケイ酸Al、D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、
無水ケイ酸、L-メントール

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に服用すること。



包 装 18包(1.4g×18)、40包(1.4g×40)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い
申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号