



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



タケダ漢方胃腸薬A

漢方製剤 あんちゅうさん〈安中散〉

第2類医薬品

特徴

- 漢方処方「安中散」の製剤で、神経性胃炎にすぐれた効果をあらわします。
- 弱った胃のはたらきを高め、慢性胃炎、胃アトニー（胃緊張減退症）にすぐれた効果をあらわします。
- ふだんから胃腸の弱い人に、好適な胃腸薬です。
- 芳香のある灰かっ色～淡黄かっ色の服用しやすい錠剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効 能

やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症
神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー

用法・用量

次の量を、食前または食間に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
7歳～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 9錠(15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

安中散料エキス	480mg(乾燥エキスとして)		
ケイヒ(桂皮)	750mg	シュクシャ(縮砂)	500mg
エンゴサク(延胡索)	750mg	カンゾウ(甘草)	500mg
ボレイ(牡蛎)	750mg	リョウキョウ(良姜)	250mg
ウイキョウ(茴香)	500mg	上記生薬より抽出	

安中散	1,500mg		
ケイヒ(桂皮)	281.25mg	シュクシャ(縮砂)	187.5mg
エンゴサク(延胡索)	281.25mg	カンゾウ(甘草)	187.5mg
ボレイ(牡蛎)	281.25mg	リョウキョウ(良姜)	93.75mg
ウイキョウ(茴香)	187.5mg		


添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ケイヒ油、ウイキョウ油、香料、トウモロコシデンプン

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) ピンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びピンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5) 服用のつどピンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入すること。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



包装 60錠、125錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号