



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



アクテージ[®]SN錠

フルスルチアミン・ピリドキサルリン酸エステル水和物・メコバラミン製剤 葉酸配合

特徴

第3類医薬品

- 「タケダ」が開発したフルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB₁誘導体）とメコバラミン（活性型ビタミンB₁₂）、ピリドキサルリン酸エステル水和物（活性型ビタミンB₆）が、「肩・首すじのこり」「手足のしびれ」などのツライ症状にすぐれた効果をあらわします。
- 末梢神経修復に関与するメコバラミンのはたらきを助ける葉酸、体のすみずみの血液循環を改善するd- α -トコフェロールコハク酸エステル（天然型ビタミンE）を配合しています。
- 黄色の糖衣錠でのみやすく、1回1錠、1日3回で効果があります。



肩・首すじのこり、
手足のしびれに

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、口内炎、食欲不振、腹部膨満感、胃部不快感、腹痛
- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
軟便、下痢、便秘

効能

次の諸症状の緩和

筋肉痛・関節痛（肩・首すじのこり、腰痛、五十肩など）、手足のしびれ、神経痛、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」

用法・用量

次の量を、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1錠	3回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守すること。

成分 3錠(1日服用量)中

成分	含量
フルスルチアミンとして (フルスルチアミン塩酸塩)	100mg 109.16mg)
ピリドキサルリン酸エステル水和物	60mg
メコバラミン	1,500μg
d-α-トコフェロールコハク酸エステル	100mg
ガンマーオリザノール	10mg
葉酸	1mg


添加物：ケイ酸Ca、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、アラビアゴム、酸化チタン、白糖、炭酸Ca、ビタミンB₂、タルク

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、葉酸によるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し、箱に入れて保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) ピンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びピンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5) 服用のつどピンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入すること。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



包装 42錠、84錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号