

金属
:キャップ
ガラス:瓶

4



アリナミン®Vゼロ 50mL

【効能】 ●疲労の回復・予防 ●体力、
身体抵抗力または集中力の維持・改善
●日常生活における栄養不良に伴う身
体不調の改善・予防:肩、首、腰または膝
の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力が
ない、身体が重い、身体がだるい、二日
酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲
れ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴
う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳
期または産前産後等の栄養補給

【用法・用量】 15歳以上は1日1回
1ビン(50mL)を服用してください
●用法・用量を守ること(他のビタミン
等を含む製品を同時に使用する
場合には過剰摂取等に注意すること)

【成分】 1ビン(50mL)中
●フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘
導体)…5mg ●リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステ
ル)…2.54mg ●ピリドキシン塩酸塩(ビ
タミンB6)…10mg ●ニコチン酸アミド…
25mg ●L-アスパラギン酸ナトリウム水
和物…125mg ●無水カフェイン…50mg
●イノシトール…400mg

添加物:アセスルファムカリウム、クエン
酸水和物、酒石酸、スクラロース、エリ
スリトール、DL-リンゴ酸、ペクチン、
パラベン、香料、エタノール、プロピレン
グリコール、pH調整剤

★本剤の服用により尿が黄色くなるこ
とがありますが、リボフラビンリン酸
エステルナトリウムによるものなので
心配ありません

疲労の回復・予防に

アリナミン®V

ZERO

糖類
ゼロ

製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**

大阪市中央区道修町四丁目1番1号

G18G

D6EX

服用に際して、ビンの表示を必ず読むこと

【使用上の注意】 **相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この
ビンを持って医師、薬剤師または登録販売者に
相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるの
で、このような症状の持続または増強が見られた
場合には、服用を中止し、このビンを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢
3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は
服用を中止し、このビンを持って医師、薬剤師
または登録販売者に相談すること

【保管および取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に保管する
こと ●小児の手のとどかない所に保管するこ
と ●使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

お客様相談室 **フリーダイヤル** 0120-567-087
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

3kcal/本

使用
期限

製造
番号