

【効能】 ●疲労の回復・予防 ●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

【用法・用量】 15歳以上は1日1回1ビン(100mL)を服用してください
 ●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

金属
:キャップ
ガラス:瓶

100mL



【成分】 1ビン(100mL)中
 フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)・・・2.5mg
 リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)・・・2.54mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・・・10mg
 ニコチン酸アミド・・・25mg
 L-アスパラギン酸ナトリウム水和物・・・125mg
 タウリン(アミノエチルスルホン酸)・・・1,000mg
 無水カフェイン・・・50mg
 添加物：クエン酸水和物、エリスリトール、スクラロース、DL-リンゴ酸、アセスルファムカリウム、安息香酸Na、没食子酸プロピル、香料、エタノール、プロピレングリコール

★本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるものなので心配ありません

疲労の回復・予防に



7つの有効成分
フルスルチアミン配合

糖類
ゼロ

製造販売元
アリナミン製薬株式会社
大阪府中央区道修町四丁目1番1号

アリナミン®ゼロ7

服用に際して、ビンの表示を必ず読むこと

〔使用上の注意〕 〔相談すること〕

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このビンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このビンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢
 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このビンを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

〔保管および取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

お客様相談室 ダイヤル 0120-567-087
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

使用期限

製造番号

5kcal/本

121CC D9