

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

91220  


せき・たんに……

# アネトン<sup>®</sup> せき止め液 分包

〈鎮咳去痰薬〉  
第②類医薬品

アネトンせき止め液 分包は、いろいろな原因で起こる“せき”をしづめ“たん”的切れをよくします。  
さわやかなレモンティー風味の液剤で、携帯に便利な1包飲みきりタイプです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください  
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症状          |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症状  |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。   |
| 呼吸抑制    | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。  |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

せき、たん

## 【用法・用量】

次の量を服用してください。

| 年齢        | 1回量         | 1日服用回数 | 症状により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。 |
|-----------|-------------|--------|------------------------------------|
| 成人(15歳以上) | 1包(10mL)    | 3回     |                                    |
| 15歳未満     | 服用しないでください。 |        |                                    |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 1回1包の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。
- (3) 開封時および服用時には、液剤の飛び出しに注意してください。

## 〈服用方法〉



## 【成分・分量】

アネトンせき止め液 分包は淡褐色透明の液剤で、成人1日量（6包）中（1包10mL）の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

| 成 分             | 分 量    | はたらき                                   |
|-----------------|--------|--|
| コデインリン酸塩水和物     | 50mg   | せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。       |
| dL-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg   | 気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしめます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg   | 抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。 |
| 無水カフェイン         | 60mg   | 頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。               |
| セネカ流エキス         | 1500mg | 気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうぐくし、出しやすくなります。        |


添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

## 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 携帯するときは、分包が折り曲がらないようにしてください。



## 【包装】

アネトンせき止め液 分包：3包

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

JNTLコンシューマーヘルス株式会社

お客様相談室：0120-101110

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

株式会社パナケイア製薬

〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地

販売元

JNTLコンシューマーヘルス株式会社

東京都渋谷区広尾 1-1-39